Musterlösungen zu Blatt 6

Kleingruppen zur Service-Veranstaltung Mathematik I für Ingenieure bei Prof. Dr. G. Herbort
im WS12/13 – Dipl.-Math. T. Pawlaschyk, 18.11.12

Thema: Vektorrechnung in $\mathbb{R}^3$

Aufgabe 1

(a) Berechnen Sie

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 11 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ -11 \end{pmatrix}$$

(b) Welchen Winkel bilden die unter (a) berechneten Vektorprodukte mit $\begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}$?

Lösungen zu Aufgabe 1

Es gilt

$$\vec{w}_1 := \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 5 - (-2) \cdot (-4) \\ (-2) \cdot 7 - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot (-4) - 5 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -29 \\ -47 \end{pmatrix},$$

$$\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 8 - 1 \cdot 6 \\ 1 \cdot 9 - (-4) \cdot 8 \\ (-4) \cdot 6 - 6 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 \\ 41 \\ -78 \end{pmatrix}$$

und

$$\vec{w}_3 = \begin{pmatrix} 11 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-5) \cdot (-11) - 7 \cdot (-2) \\ 7 \cdot 8 - 11 \cdot (-11) \\ 11 \cdot (-2) - (-5) \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 69 \\ 177 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Die Winkel zwischen α_j und $\vec{w}_0 := \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}$ werden so berechnet:

$$\cos \alpha_1 = \frac{\langle \vec{w}_1, \vec{w}_0 \rangle}{\|\vec{w}_1\| \cdot \|\vec{w}_0\|} = \frac{552}{\sqrt{3339} \sqrt{122}} \approx 0.8648, \quad \alpha_1 \approx 30^\circ 8',$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{\langle \vec{w}_2, \vec{w}_0 \rangle}{\|\vec{w}_2\| \cdot \|\vec{w}_0\|} = \frac{659}{\sqrt{9529} \sqrt{122}} \approx 0.611197, \quad \alpha_2 \approx 52^\circ 32',$$

$$\cos \alpha_3 = \frac{\langle \vec{w}_3, \vec{w}_0 \rangle}{\|\vec{w}_3\| \cdot \|\vec{w}_0\|} = \frac{-105}{\sqrt{36414} \sqrt{122}} \approx -0.0498, \quad \alpha_3 \approx 92^\circ 51'.$$

Aufgabe 2

(a) Prüfen Sie mit Hilfe des Vektorprodukts, ob die folgenden Vektoren linear unabhängig sind.

$$(i) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad (ii) \begin{pmatrix} 11 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -16 \end{pmatrix}$$

(b) Finden Sie eine Zahl s , so dass die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ s \\ -2 \end{pmatrix}$$

linear abhängig werden.

Lösungen zu Aufgabe 2

Laut Vorlesung sind drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ genau dann linear unabhängig, wenn

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle \neq 0.$$

Zu (a), Teil (i)

$$\left\langle \begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 + 2 = 4 \neq 0.$$

Die Vektoren sind also linear unabhängig.

Zu Teil (ii)

$$\left\langle \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-12) - 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-3) - 11 \cdot (-12) \\ 11 \cdot (-1) - (-3) \cdot (-3) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -16 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 40 \\ 120 \\ -20 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 \\ -8 \\ -16 \end{pmatrix} \right\rangle = 640 - 960 + 320 = 0$$

Die Vektoren sind linear abhängig.

Zu (b)

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \\ (-2) \cdot (-3) - 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-3) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ s \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ s \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = 10 - 2s$$

Für $s = 5$ verschwindet dieser Ausdruck, sodass die Vektoren linear abhängig werden.

Aufgabe 3

Gegeben seien die Geraden G_1 durch die Punkte $\vec{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{B} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ und die Gerade

G_2 durch die Punkte $\vec{C} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{D} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$.

(a) Zeigen Sie, dass $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ ist.

(b) Angenommen, die Gerade G^t entsteht aus G_1 durch Verschiebung um t in x_3 -Richtung, d.h.

$G^t = G_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{pmatrix}$. Wie muss man t wählen, damit G^t die Gerade G_2 schneidet?

Lösungen zu Aufgabe 3

Es gilt

$$G_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad G_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Die Gerade G^t ist dann durch

$$G^t = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ -2+t \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gegeben. Es ist dann $G_1 = G^0$. Wir berechnen

$$\langle \vec{A} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{pmatrix} - \vec{C}, \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ -15 \end{pmatrix} \rangle = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 13 \\ -4+t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 173 \\ 76 \\ 29 \end{pmatrix} \rangle = 29t + 1045$$

Für $t = 0$ ist dies nicht Null, also treffen sich G_1 und G_2 nicht. Die Geraden G^t und G_2 sind nicht parallel. Damit sie sich treffen, muss daher $t = -\frac{1045}{29}$ gewählt werden.

Aufgabe 4

Sei E die Ebene, die durch die Punkte $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$ verläuft. Seien $\vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$

und $\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie jeweils den Abstand von $\vec{x}$ und $\vec{y}$ zur Ebene E , sowie jeweils die Gerade, die durch $\vec{x}$ bzw. $\vec{y}$ verläuft und senkrecht auf E steht.

Lösungen zu Aufgabe 4

Die Ebene E ist durch folgende Parameterform gegeben:

$$E = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \left[\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \right] + \mathbb{R} \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Wir berechnen den auf E liegenden Normalenvektor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2) \cdot 2 - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot (-4) - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 5 - (-2) \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 \\ -14 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Seine Länge beträgt

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{19^2 + 14^2 + (-3)^2} = \sqrt{361 + 196 + 9} = \sqrt{566}.$$

Sei $\vec{A} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix}$ der Ortsvektor von E aus der obigen Parameterform. Wird $\vec{x}$ auf die Ebene E projiziert, so erhält man den Vektor

$$P_E(\vec{x}) = \vec{x} + \frac{\langle \vec{A} - \vec{x}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

Die Länge des Vektors $P_E(\vec{x}) - \vec{x}$ ist dann der Abstand $d(\vec{x}, E)$ von x zu E .

$$d(\vec{x}, E) = \|P_E(\vec{x}) - \vec{x}\| = \frac{|\langle \vec{A} - \vec{x}, n \rangle|}{\|n\|} = \frac{\left| \left\langle \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ 14 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -19 \\ -14 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle \right|}{\sqrt{566}} = \frac{|114 + 56 - 42|}{\sqrt{566}} = \frac{128}{\sqrt{566}}$$

Analog für $\vec{y}$:

$$d(\vec{y}, E) = \|P_E(\vec{y}) - \vec{y}\| = \frac{|\langle \vec{A} - \vec{y}, n \rangle|}{\|n\|} = \frac{\left| \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -19 \\ -14 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle \right|}{\sqrt{566}} = \frac{|-19 - 18|}{\sqrt{566}} = \frac{37}{\sqrt{566}}$$